

Kanoetstrandloper

Wetenschappelijke naam
Calidris canutus

Kanoetstrandlopers zijn strandlopers met een korte nek en stevige poten. Ze hebben zich helemaal gespecialiseerd in het zoeken naar schelpdieren.



Als ze voedsel zoeken, zie je ze langzaam over het wad struinen met voorovergebogen kop en hun snavelpunt in het slik gedrukt. Bij elkaar eten alle kanoetstrandlopers jaarlijks ongeveer 1,5 miljoen kilo schelpdiervlees uit de Nederlandse waddenbodem!

Geurig heerschap

Kanoeten beschermen hun veren met een wasachtige stof die in een klier bij hun stuitje wordt gemaakt. In de broedtijd verandert de was zodat het minder sterk ruikt. Poolvossen en andere roofdieren kunnen de vogels daardoor moeilijker ontdekken.

Kanoetstrandlopers broeden ver in het noorden in Groenland en Siberië. Ze kunnen alleen leven bij zee-kusten. Bij zoete wateren in het binnenland worden ze ziek.

Vogeltrek

De strandlopers gebruiken Nederland als rustplaats tijdens de trek, of als overwinteringsgebied. Vooral in de Waddenzee kunnen tijdens de vogeltrek grote groepen kanoeten gezien worden, het is een belangrijk bijtankstation. Ze eten zich er vol met schelpdieren en kreeftjes, zodat ze met genoeg energie hun reis kunnen vervolgen.

Voor de lange reizen hebben de kanoeten veel energie nodig, die ze in de vorm van vet opslaan. Een kanoet op doortocht naar Afrika kan in de Waddenzee in ongeveer een maand tijd de vetvoorraad opbouwen. Vlak voor vertrek kan de vogel wel 150 gram wegen. Dat is twee keer zo zwaar als bij aankomst, na een vlucht van een paar duizend kilometer! Tijdens de reis verteert de kanoet ook nog organen, die hij even niet nodig heeft, zoals de maag. Hart en longen worden juist groter.