

Ringslangachtigen

Meest voorkomende slangen

De ringslangachtigen vormen de grootste slangenfamilie. Bijna twee derde van de slangen behoren tot deze familie. Ze komen ook overal voor, behalve op Antarctica. Ze bewonen verschillende gebieden, van zoetwatermeren tot dorre woestijnen. En ze zijn er in veel verschillende kleuren, soorten en maten.



Lichaam

Ringslangen hebben een linkerlong die niet of nauwelijks gebruikt wordt. De ademhaling gaat via de rechterlong. Ook hebben ze een flexibel kopskelet, waardoor ze de kaken heel wijd open kunnen doen. Zo kunnen ze grote prooien makkelijk verzwelgen. Ringslangachtigen hebben grote, plaatvormige schubben op hun kop.

Gif

Een paar ringslangsoorten, zoals de rattenslang, zijn wurgslangen. De meeste ringslangen zijn niet giftig. De ringslangen die dit wel zijn, hebben meestal maar één paar giftanden. Sommige soorten hebben er twee of zelfs drie.

De meeste gifslangen zijn ongevaarlijk voor mensen. Dit komt omdat hun tanden vrij ver achter in de bek liggen. Hierdoor kunnen ze bij een beet niet direct op ons lichaam ingebracht worden, behalve als het dier door kauwt. Ook is hun gif vrij zwak.

Als je een boomslang en twijgslang tegenkomt, moet je wel oppassen. Die zijn wel dodelijk!



Voortplanting

Er zijn zowel eierleggende als levendbarende (niet-eierleggende) ringslangen. Bij de eierleggende soort varieert het aantal eitjes van 1 tot meer dan 100. De jongen zien er meestal hetzelfde uit als hun ouders.